



## Dix bonnes raisons pour lesquelles les trappeurs devraient porter des gants imperméables

Pour se protéger contre les maladies transmises par les animaux, il suffit d'enfiler une paire de gants, même s'il ne s'agit pas de la première chose à laquelle on pense lorsqu'on doit manipuler des animaux. Voici 10 raisons pour lesquelles vous devez ajouter des gants imperméables à votre trousse de piégeage.

### 1. La rage

Comment peut-on la contracter? Par des morsures, lors d'un contact de matières infectieuses (la salive, les glandes salivaires, le cerveau et le tissu de la moelle épinière) d'animaux atteints de la rage qui pénètrent par une coupure de la peau ou lors d'un contact avec des muqueuses (les yeux, le nez ou la bouche).

### 2. La tularémie

Comment peut-on la contracter? Lors du contact du sang, de fluides corporels ou de tissus d'animaux infectés avec la peau du trappeur, par une coupure de la peau ou avec les muqueuses.

### 3. La leptospirose

Comment peut-on la contracter? Lors du contact de l'urine, du sang, de fluides corporels ou de tissus corporels d'animaux infectés avec la peau du trappeur, par une coupure de la peau ou avec les muqueuses.

### 4. La listériose

Comment peut-on la contracter? Lors du contact du sang, de fluides corporels ou de tissus corporels d'animaux infectés avec la peau du trappeur, par une coupure de la peau ou avec les muqueuses, ou encore en mangeant de la viande insuffisamment cuite.

### 5. L'érysipèle

Comment peut-on le contracter? Lors du contact du sang, de fluides corporels ou de tissus corporels d'animaux infectés avec la peau, par une coupure de la peau ou avec les muqueuses.

### 6. La gale sarcoptique

Comment peut-on la contracter? Lors du contact de la peau et du poil d'animaux infectés avec la peau du trappeur.

### 7. La giardiase

Comment peut-on la contracter? Lors du contact de la matière fécale provenant de l'intestin ou de la peau d'animaux infectés avec les mains et la bouche du trappeur.

### 8. Le syndrome de larva migrans viscérale provoqué par *Baylisascaris procyonis* (vers ronds du raton laveur)

Comment peut-on le contracter? Lors du contact de la matière fécale provenant de l'intestin ou de la peau d'animaux infectés avec les mains et la bouche du trappeur.

### 9. L'échinococcose

Comment peut-on la contracter? Lors du contact de la matière fécale provenant de l'intestin ou de la peau d'animaux infectés avec les mains et la bouche du trappeur.

### 10. Le syndrome pulmonaire dû à l'hantavirus

Comment peut-on le contracter? Lors du contact de la salive de l'urine ou les excréments frais ou desséchés de rongeurs infectés avec les muqueuses du trappeur; il se transmet également par des morsures.

Plusieurs de ces maladies transmises par les animaux peuvent être très graves si elles sont contractées par les humains; elles peuvent même être mortelles. Ne prenez pas de risques inutiles. Protégez-vous en utilisant des gants imperméables ou des gants de chirurgie lors de la manutention d'animaux que vous avez capturés. Même les gants de caoutchouc que l'on trouve dans le rayon des produits d'entretien ménager de l'épicerie font l'affaire!

Pour obtenir d'autres renseignements sur les moyens de vous protéger, vous et vos proches, des maladies transmises par les animaux, consultez le site [www.gnb.ca/rage](http://www.gnb.ca/rage).